WARTOŚCI PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH – DZIECI :

**Podział na grupy wiekowe:**

| | |
|---|---|
| noworodek | poniżej 4. tygodnia życia |
| niemowlę | od 1 miesiąca do 1. roku życia |
| dziecko | od 1 roku życia do ukończenia pokwitania |

**Masa ciała**

Masa ciała(kg)=2x(wiek w latach+4)

**Częstość oddechów**

| Wiek (w latach) | Częstość oddechów (oddechy/min) | **Oddechy ratownicze u dzieci** |
|---|---|---|
| poniżej 1 | 30-40 | Rozpoczynamy zawsze kiedy oddechy <10, 10>resuscytacja oddechowa do prawidłowej częstości oddechów danej grupy wiekowej. |
| 2-5 | 24-30 | |
| 5-12 | 20-24 | |
| powyżej 12 | 12-20 | |

**Częstość pracy serca (średnia)**

| Wiek | Częstość pracy serca |
|---|---|
| Noworodek – 3miesiąc życia | 140 |
| 3m-2 lata | 130 |
| 2lata-10lat | 80 |
| >10 lat | 75 |

| Wiek | Tachykardia | Bradykardia | **Uciskanie klatki piersiowej u dzieci** |
|---|---|---|---|
| < 1 roku | >180 | <80 | Rozpoczynamy kiedy AS <60 (przy złej perfuzji i nitkowatym tętnie) |
| >1 roku | >160 | <60 | |

**Ciśnienie**

| | Ciśnienia krwi skurczowe | w (mmHg) |
|---|---|---|
| Wiek | Prawidłowo | Dolna granica |
| 0-1 miesiąc | >60 | 50-60 |
| 1-12 miesięcy | 80 | 70 |
| 1-10 lat | 90+2x wiek w latach | 70+2x wiek w latach |
| >10 lat | 120 | 90 |